

Vaccinatie van duiven en hoenders

Vaccinatie (alleen bij deelname aan verzameling, TT, show, beurs, markt, wedstrijd enz.)

Alleen afstammelingen van Columba livia (rotsduif), zoals reisduiven en sierduiven, dienen ingeënt te zijn. (vaccinatie met Colombovac PMV, Colombovac PMV/POX of Nobivac paramyxo, methode volgens voorschriften van vaccin)

Tortels en Lachduifjes (geslacht Streptopelia) en exotische duifjes zoals bv. Diamantduif (geslacht Geopelia) NIET.

Kwartels dienen ingeënt te zijn behalve de dwergkwartel. (vaccinatie met geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Fazanten en patrijzen (La Sota of gekloneerde La Sota, drinkwatermethode – volle dosis)

Pauwen (vaccinatie met geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Parelhoenders en kalkoenen (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

Sierpluimvee (La Sota of gekloneerde La Sota, drinkwatermethode – volle dosis)

Ook loopvogels (Struisvogels, Emoës, Nandoes en Kasuarissen) dienen gevaccineerd te worden. (methode in samenspraak met de dierenarts)

Eenden, ganzen en waadvogels dienen NIET gevaccineerd te worden.

Alle inentingën dienen uitgevoerd of begeleidt te zijn door een dierenarts (attest!!)

Nationaal secretaris
Jan Van Looy